

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP-1-8

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Tél. (78) 60-95-87 (Postes 426 et 427) Tél. (78) 62.20.30 (P. 426 & 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Bulletin N° 92

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

29 Juillet 1977

V I G N E

MILDIOU - L'évolution de cette maladie se poursuit et l'on note des foyers de Rot brun dans certaines parcelles mal protégées.

Il importe donc de maintenir la vigilance et d'effectuer, si possible après rognage, un nouveau traitement fongicide efficace. On utilisera une spécialité commerciale à longue rémanence (notamment l'une d'entre elles contenant du cuivre), et ayant, le cas échéant, une action secondaire vis-à-vis du Botrytis.

TORDEUSES DE LA GRAPPE - Le début du 3ème vol de l'Eudémis pourrait se manifester très prochainement dans l'extrême sud de la Circonscription. Nous préciserons son évolution dans un prochain bulletin. Aucune intervention n'est à réaliser pour le moment vis-à-vis de cette génération.

ARAIGNEES ROUGES - Quelques foyers d'araignées rouges ont été observés, notamment en Beaujolais. Opérer une surveillance attentive des parcelles, afin de pouvoir exécuter, le cas échéant, un traitement estival spécifique sur les foyers caractérisés.

ARBRES FRUITIERS

TORDEUSE ORIENTALE - Maintenir la protection tout en respectant les délais d'application des pesticides.

CARPOCAPSE (pompes, poires, noix) - Poursuite du vol et rappel de la nécessité du maintien d'une bonne protection insecticide, selon les prescriptions de notre avis du 20 Juillet. Le traitement conseillé devrait être renouvelé à partir du 5 Août. Il sera également étendu aux régions d'altitude.

En cas de fortes précipitations, cette protection est à répéter dans les plus brefs délais.

Dans les vergers de poiriers proches de vergers de pêcheurs dont la récolte est terminée, on utilisera un produit également efficace contre la Tordeuse Orientale.

TAVELURES - Dans les plantations où des taches sont visibles et sur variétés tardives, on appliquera un nouveau traitement, dès réception.

OIDIUM DU POMMIER - (sur variétés sensibles et situations exposées) - La protection estivale nous paraît plus particulièrement nécessaire cette année. Exécuter un nouveau traitement spécifique.

GRANDES CULTURES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - Sur les variétés sensibles, la protection fongicide est à renouveler. Le défanage chimique pourrait être envisagé, dès constatation de la maturité des tubercules, surtout si les opérations d'arrachage étaient entravées par les pluies.

DORYPHORE - Maintenir la protection sur les pommes de terre de variété tardive.

Le Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Rhône-Alpes",

R. GIREAU.

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - Le Directeur-Gérant : P. JOURNET.
Inscription à la C.P.P.A.P. N° 477 AD.

P284